

Verenigingsblad

Maart 2015, 16^e jaargang nr. 1

Beste leden

Hebt u dat ook wel eens, vol verwachting ga je voor de buis zitten - nou ja buis, flatscreen eigenlijk - en dan is het programma niet wat je er van verwachtte. Dat kan natuurlijk aan de verwachting liggen, soms verwacht je teveel. Dit had ik bij het programma "Van Hollandse bodem", een programma op de donderdagavond over tuinieren. Eigenlijk hebben we dat ook met het tuinieren zelf. Heb je iets leuks gezaaid en goed je best gedaan, ga je elke dag vol verwachting naar de bodem staan staren en na weken kom je tot de conclusie 'het zaad of ik deug niet'. Nu heeft het bestuur wel de verwachting dat dit tv programma en de leuke zaadactie bij onze dorpse grootgrutter (AH) het ledental van onze vereniging omhoog zal stuwten. Hoe het ook zij, we verwachten weer een mooi tuinjaar en veel tuinplezier. Helaas verwachten we ook activiteiten van het dievengilde. Let op, spreek mensen die u niet kent aan; hou ogen en oren open.

Monilia

Wie kent dit beeld van een rotte peer of appel met van die mooie schimmelpatronen niet. De naam is Monilliarot. Monilliarot treedt op in de boomgaard en tijdens de bewaring. Vooral pruimen en kersen, die na regen kunnen barsten, zijn erg gevoelig voor Monilliarot. Op de rottende vruchten ontstaan karakteristieke concentrische ringen van geelbruine sporenhoopjes. Vaak verdrogen de aangetaste vruchten en blijven ze als mummies aan de boom hangen. Soms kunnen aangetaste vruchten ook geheel doorwoekerd worden. Ze blijven dan stevig en zien soms glanzend zwart, men noemt dat leerrot. Onder vochtige omstandigheden groeit dicht wit schimmelpluis over de vruchten heen, wat vervolgens weer andere vruchten kan aantasten. Dit witte schimmelpluis is de ongeslachtelijke vorm van de schimmel en heet Monila fructigena of M. laxa. Besmetting van de vruchten vindt vooral plaats via wondjes. Beide schimmels komen op veel planten voor, waaronder pit- en steenfruitgewassen. Monila



© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen UR

laxa kan zowel vruchten, scheuten als bloemen aantasten. Monila fructigena tast vrijwel alleen vruchten aan. Monilia overwintert als mycelium in afgevallen aangetaste vruchten of in scheutkankers. Conidiën (sporen), die in de kankers gevormd worden, infecteren in het voorjaar de bloemen. Vanuit de bloemen vinden nieuwe infecties plaats van scheuten en van vruchten. Voor infectie van vruchten is een wondje nodig. Aantasting op appel en peer lijkt vooral veroorzaakt te worden door sporen afkomstig van aantastingen op nabijgelegen steenfruit.

Adres:

VOORJAARCIRCULAIRE

Hier even een paar belangrijke punten uit de voorjaarscirculaire. De complete circulaire staat op onze website en hangt op de publicatieborden.

1. Aardappelen:

Deze moeten gepoot worden op de B-strook, dit is vanaf het pad gezien, de tweede, dus middelste strook, ongeveer 6,65 meter lang. N.A.K. goedgekeurd pootgoed is verplicht. Volgens een besluit van de algemene ledenvergadering van 1987 is het bespuiten tegen Phytophthora verplicht. Begin hier vroeg mee. Als de plant boven de grond komt, is het infectiebaar (besmetbaar). Raadpleeg bij twijfel een deskundige. Door de keuringscommissie zal er ook gecontroleerd worden op Phytophthora. Als deze schimmelziekte geconstateerd wordt, kunt u opdracht krijgen het loof te verwijderen om besmetting naar andere percelen te voorkomen en na het rooien zieke knollen af te voeren en niet onder te spitten. Bent u langdurig afwezig zorg dan dat toch wordt gespoten.

2. Tuinkeuring:

De keuringscommissie bestaat uit de Stoffel Aarsen en Jacqueline Langendijk. Tuinkeuringen zullen in de maanden april tot en met september plaatsvinden. Niet naleven van de regels kan consequenties hebben voor de tuin-der.

3. Naambordjes: Aan de padzijde van iedere tuin hoort een bordje geplaatst te zijn met daarop duidelijk leesbaar uw

naam en het tuinnummer.

4. Asbest:

Bij nieuwbouw of herbouw mag, volgens wettelijke regels, geen asbest houdend materiaal worden toegepast. Dit geldt ook voor andere toepassingen zoals composthopen en afzettingen. Is asbest aanwezig, voer het dan volgens de voorschriften af naar de gemeente. Bij onze 'kiosk' staat een ton waar hele kleine stukjes asbest in kunnen.

Van fruitbomen en snoeien

Er staan heel wat fruitbomen op het complex. Een reden om eens wat aandacht aan die bomen te besteden, want vooral het snoeien is een kunst op zich. Dat bloeiende fruitbomen een lust voor het oog zijn, zien we elk voorjaar ook op ons complex.

Een fruitboom loopt in het voorjaar uit op de energiereserves van het vorig jaar. De voor-

jaarsgroei loopt zo door tot juli. De energie wordt gestopt in de groei/bloei van de knop. In september en oktober gaat de energie naar de groei van de takken. In november haalt de boom de helft van de energie uit het blad en slaat dit op. De andere helft van de energie blijft in het blad zitten; dit verkleurd en valt van de boom op de grond.

Maar goed laten we niet van de hak op de tak springen.

1 Onderstam


Stam van een andere boom waarop de appelboom is geënt of geoculeerd.

2 Entplaats / entknobbel

De plek waar de ent en de stam zijn vergroeid, is verdikt en daardoor duidelijk zichtbaar.

3 Tussenstam

Vaak is een appel/vruchtboom tweemaal geënt, met behulp van een tussenstam, lengte 30



HEYBOER BV



Spuiten met o.a. zelfrijdende Delvano's op 45m, Bio/Eko spuitwerk
Specialist en groothandel in gewasbescherming
Teeltbegeleiding (ook Veldleeuwewik) akkerbouw en vollegronds groenten
Fruitteelt, bloembollen en groensector
S.K.L. Keuring en advies spuittechniek
CDG en VKL gecertificeerd
Leverancier van o.a. uienzaad, wortelzaad, tarwezaad, maiszaad en graszaden
Heyfax & Phytifax informatiesysteem
Heylab-grond en gewasonderzoek
Gespecialiseerd loonbedrijf in o.a. uien, wortelen, witlof en tulpen
Deelnemer in Innoventis: onderzoek in gewasbescherming en bemesting in akkerbouw en bloembollen

Biddinghuizen
Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
Zeewolde
tel. 0321-335033
Fax. 0321-335048
www.heyboerbv.com

Espel
Bosrand 25
8311 AS Espel
06-51311399
0321-335048

Zeewolde
Oogstweg 22
3899 BK
036-5221250
036-5224150

Het meest complete bedrijf in gewasbescherming

tot 75 centimeter. Dit wordt gedaan voor een betere symbiose tussen de appel en de onderstam, om de groei te sturen of te remmen, om de hoogte van de vertakking te beïnvloeden, om de winterhardheid te vergroten of om stambasisrot op de stam te voorkomen.

4 Opslag

Met opslag worden alle scheuten of twijgen bedoeld die spontaan groeien onder de entplaats. Verwijder opslag vanaf mei tot begin september door de scheuten met de hand af te scheuren. Bij gebruik van een snoeischaar blijft er vaak een klein stompje over dat opnieuw scheuten vormt.

5 Harttak

Het hart van de boom, de centrale stam waar dan alle andere takken groeien.

6 Kader of frame

De onderste gesteltakken samen met de harttak.


7 Gesteltakken

Ook wel draag- of zijtakken genoemd. Dit zijn de onderste, stevige takken die vrijwel horizontaal op de harttak staan en de boom vorm geven.

Gesteltakken worden alleen gesnoeid als de boom nog moet groeien, om de juiste vorm te bereiken.

8 Vruchthout / vruchttakken

Dit zijn de korte twijgen met veel bloemknoppen, die uiteindelijk de vruchten dragen. Het vruchthout staat bij voorkeur zoveel mogelijk verticaal op de gesteltak. Snoei vruchthout dat aan de boven- (rughout) en onderkant (buikhout) van de gesteltak groeit weg. Hieraan groeit doorgaans slecht belicht en daardoor slecht gekleurd fruit.



9 Gewone vruchttwijn

Eenjarige uitloper, 10 tot 20 centimeter lang.

10 Broek

Deel van de boom tussen harttak en gesteltak, waar weinig zonlicht komt.

11 Verlengenis

Stevige, eenjarige twijn aan het uiteinde van een gesteltak.

Groeit ook aan het uiteinde van stam en harttak. Groeien er meerdere dan spreekt men van concurrenten (12). Deze twijn wordt ingekort zolang de gesteltak nog niet zijn uiteindelijke lengte heeft bereikt.

Daarna wordt hij helemaal weggehaald.

12 Concurrent

Sterke twijn in de directe omgeving van de verlengenis.

Deze wordt weggesnoeid, omdat hij een open structuur in de boom of kroon belemmert.

13 Afgedragen hout

Takken waaraan vruchten hebben gehangen. Deze snoeit u terug, zodat de boom zich kan verjongen.

14 Kortloten

Takken met een aantal dicht op elkaar zittende knoppen, verdikte stukjes waar takken of bloemen aan de stengel zitten. Bomen met veel kortloten vormen de meeste vruchten.

15 Langloten

Takken waarop de knoppen verder uit elkaar zitten zijn (te)

snel gegroeid; geven niet veel vruchten. Te veel langloten zijn niet wenselijk, dus wegsnoeien.

16 Waterloten

Lange scheuten die ontstaan op snoeiwonden of knoppen die geen bloesem hadden.

Makkelijk te herkennen omdat ze recht omhoog groeien en snel lang worden. Snoei deze altijd helemaal weg, ze vragen veel energie van de boom. Niet half doorknippen, dan vormen ze weer uitlopers.

17 Gaffel / vergaffeling

Een frametak die zich splitst in twee even dikke takken.

18 Stomp

Deze kapstok blijft over na het wegzagen van een gesteltak of te dik vruchthout. Hierop groeien waterloten.

19 Spoor(tje)

Zeer kort (1 tot 5 centimeter) vruchthout, is bloemdragend. Als de spoortjes te dicht op elkaar staan, dun je ze in de winter uit.

20 Gemengde knop

Opvallend dikke knop met bloemen en bladeren. Veelal te vinden aan korte twijgen.

21 Bladknop

Smalle, puntige knop met uitsluitend bladeren.

22 Eindknop

Knop aan het einde van een tak. Door deze knop, waar vaak ook bloemen in zitten, weg te knippen, voorkom je dat er appels gaan groeien aan het einde van de tak, die daardoor naar beneden zal doorbuigen.

Snoeien

In een fruitboom, eigenlijk bij alle bomen, schieten communicatie signalen van beneden naar boven en omgekeerd. Snoeien we nu takken weg of breekt er een tak af dan gaat er

een signaal naar de wortels om meer groeistof te produceren en naar boven toe te voeren om de verstoorde balans te herstellen.

Daardoor heeft te rigoureux snoeien of op een verkeerd moment snoeien vaak een tegengesteld effect. Rond de wond krijgen de takken een groeispurt en worden ook nieuwe takken gevormd.

Om in deze situatie de groei te remmen en de balans in de fruitboom te herstellen zonder ingrijpen door in takken te snoeien, kun je ook wortelsnoei toepassen.

Bij wortelsnoei, in de winter, graaf je een lange geul van één spade breed en twee of drie spaden diep langs de voet van de fruitboom op ongeveer 30 cm afstand van de stam. Op deze wijze worden alle kleine en grote wortels doorsneden. Na het graven gooi je de gegraven geul weer dicht. Graaf eerst een geul aan één zijde en wacht af wat het resultaat wordt. Is het resultaat niet voldoende dan doe je het zelfde aan de andere kant.

Een ringsnede in de bast van de boom heeft ook een remmend effect. Een bijkomend voordeel van ringsnede is dat het de suikers in de top van de boom houdt. Deze suikers zorgen voor meer bloesem en fruitvorming. Doormiddel van het ringen (rondom dan spiraals-

gewijs) van de barst kun je een, te uitbundige groei van een fruitboom remmen.

In de herfst sterft het blad in de boom af, maar onder de grond sterft dan ongeveer eenzelfde hoeveelheid organisch materiaal aan wortels.


Wanneer in het voorjaar de knoppen uitlopen, lopen ook de wortels weer uit. Ook hier is evenwicht.

Zomersnoei

Traditioneel worden de fruitbomen in de wintermaanden gesnoeid. In ieder geval de appels en de peren. De pruimen en kersen worden per definitie al in de zomer gesnoeid. Uit onderzoek blijkt dat ook voor de appels en peren de snoei in de zomermaanden (periode van half juli tot half september) overwogen kan worden. Sterker zelfs, de zomersnoei biedt een hoop voordelen.

- Na het uitvoeren van een zwaardere ingreep tijdens de zomermaanden (i.v.m. wegwerken achterstallig snoeiwerk) zal de boom minder fors reageren en dus niet zo massaal waterscheuten vormen.

- In de zomer is het afgrendelingsmechanisme van de boom optimaal in werking. Dit geeft minder kans op binnendringen van ziektekiemen in de snoeiwonden.



LOOMANINSTALLATIES

VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV en WATER
DEALER ATAG VERWARMING

Korenmaaier 13-15
8256 SK Biddinghuizen

Telefoon: 0321-33 11 45
Fax: 0321-33 38 45
E-mail: j.looman@hetnet.nl

• Zomersnoei geeft een beperkte hergroei. In een boom die erg hard groeit zal door zomersnoei de reactiegroei beperkt blijven.

• Snoei in de zomer gaat niet ten koste van de vruchtdracht voor de daarop volgende seizoenen. Bij wintersnoei is dit wel het geval.

• Tijdens zomersnoei kunnen gelijktijdig zieke takken weggesnoeid worden. Denk hierbij aan meeldauw.

• Door het open snoeien van de boom in de zomer krijgen schimmelziektes als schurft minder kans.

• Door zomersnoei verkrijgt men een betere belichting van de vruchttakken. Dit resulteert in sterke knoppen voor het komende seizoen maar ook in een betere kleuring van de vruchten die op boom hangen.

Vormingssnoei

Nadat de fruitboom is aange-

plant is het belangrijk de eerste vormsnoei toe te passen omdat de boom over een te klein wortelgestel beschikt met een minimum aantal haarwortels. Vormt zich nu blad aan de boom dan kunnen de wortels de vraag niet aan. Water geven heeft dan ook geen zin. Bij het planten de boom uiteraard wel in wateren, zodat er geen lucht tussen de wortels blijft zitten. Ook is de kans groot dat je kale takken krijgt met bovenin de bladeren, zogenaamde pluizen. Als regel voor een open kroon 3 tot 5 gesteltakken aanhouden. Het is de kunst om deze takken een evenredige cirkel te laten vormen. Ideaal is het wanneer de gesteltakken dezelfde schuintegraad hebben, dan is ook de groeikracht hetzelfde. Bij hoogstambomen die met één centrale stam omhoog gaan, spreek je van piramidale groei. Dit is de natuur-

lijke groeiwijze van de meeste perenrassen. Zo'n boom wordt gevormd door op regelmatige afstand rondom zijtakken te laten groeien (een etage) welke dan op dezelfde manier worden onderhouden als de gesteltakken van een open kroon. Heb je de gesteltakken bepaald dan kunnen de overige takken worden weggesnoeid. Kort de eindscheuten consequent in tot

2 a 3 knoppen. Knip ze af net boven een knop die naar buiten is gericht. Deze bovenste knop van de ingekorte tak zal nu als eerste beginnen te groeien, omdat door het wegnemen van hout erboven de sapstroom naar deze knop afgebogen is. Zijn er te veel eindscheuten, verwijder die dan helemaal. Wanneer je je mede aan deze richtlijn houdt, is de opbouw van een mooie open boomkroon verzekerd.

Jonge bomen waarbij de vormingssnoei goed is uitgevoerd kunnen na enkele jaren al gesnoeid worden zoals een volwassen fruitproducerende boom.

Het snoeien van de fruitboom in de jeugdfase wordt de vormsnoei genoemd. De vormsnoei zorgt voor een bepaald model van de boomkroon. Dit model bestaat uit meerdere etages van gesteltakken met als doel zo veel mogelijk zonlicht te vangen.

Onderhoudssnoei

Na de vormsnoei, wanneer de fruitboom zijn globale vorm heeft gekregen, de kroonvorm is bepaald en de boom vruchten gaat dragen, gaan we over tot de onderhoudssnoei.


Het doel van deze snoei is:

- Het frame van gesteltakken in stand te houden;
- De boom te begeleiden/reguleren in de groei;
- De productie van vruchthout te bevorderen.

Er dient een evenwicht te ontstaan tussen groei en vruchtbaarheid. Een fruitboom verdeelt immers zijn energie over

4118 artikelen in één winkel? Tel maar na!

Denkt u bij Gardenbroek vooral aan diervoeders en dierbenodigdheden? Loop dan toch eens wat uitgebreider door onze winkels. We hebben immers naast 921 verschillende dierenartikelen nog ruim 3000 verschillende producten. Van aardappelen tot waspoeders, van visspullen tot werkschoeisel. Geloof u 't niet? Tel ons assortiment gerust even na. Trouwens, over tellen gesproken: wie naar onze prijzen kijkt, ziet meteen dat we heel wat euro's voordeliger zijn. Tel uit uw winst!



Gardenbroek

Elburg: Zuiderzeestraatweg Oost 10 - (0525) 68 14 04
Gardenbroek "Super voor Mens en Dier"
Het Straatje 2a 8081 RN Elburg
E-mail: info@gardenbroek.nl

ALLES VOOR DIERENVRIENDEN

veel verschillende processen, waaronder:

- Het vormen van nieuwe scheuten;
- Het maken van nieuwe bloemknoppen;
- Het maken van vruchten.

Een juiste balans tussen die processen is van belang. Als een boom goed in balans is, dan maakt hij vanzelf bloemknoppen en hoeft dat niet door snoei te worden bevorderd.

De keuze van de wijze en mate van onderhoudssnoei heeft ook weer te maken met het doel dat we voor ogen hebben. Voor de fruitproductie is het belangrijk dat er voldoende licht in de boom kan binnendringen. Hierbij wordt gestreefd naar licht en lucht op alle plekken in de kroon. Daarnaast is het van belang het vruchthout regelmatig uit te dunnen of te verjongen.

Bij het snoeien begin je onder in de boom en werk je naar boven toe aan zichtopbouw.

Wat bij iedere snoeibeurt weggenomen moet worden zijn:


- Gebroken en dode takken.
- Takken die dwars door de kroon groeien.
- Waterloten en sterke zuigers
- Wildopslag onderaan de stam
- Zieke takken.
- Scheurende takken.

Op de hoogste punten van de gesteltakken zal de groei het sterkst zijn. Hier ontwikkelen zich veel waterloten. Door telkens een van de krachtigste eenjarige waterloten te handhaven, zal het aantal nieuwe loten een volgend seizoen worden verminderd. Als de boom echter goed aan het produceren

is dan zal de groei van de gesteltakken al verminderd zijn en zijn er ook weinig waterloten of reactiehout te verwachten. Na ongeveer twintig tot veertig jaar heeft de boom zijn 'maat' bereikt. De maat van een fruitboom wordt onder meer bepaald door de keuze van de onderstam. Wanneer we fruitproductie als (neven)doelstelling hebben, kunnen de gesteltakken nu overgaan in vruchthout. Dit gebeurt door terug te snoeien op een naar buiten gerichte vruchttak. Op de plek waar is teruggesnoeid kunnen zich jaarlijks in meer of minde-

re mate nieuwe scheuten ontwikkelen. Deze kunnen worden gebruikt als nieuw vruchthout. Het terugsnoeien van de gesteltakken zorgt voor vruchthout en geen kalende takken.

Eind juni is een goed moment om de waterlotscheuten (waterloten) weg te trekken, er is dan geen kans op herhaling van hergroei. Het is een goed tijdstip omdat de scheuten dan nog niet verhout zijn en het weg halen gemakkelijk gaat. De wond op de tak is dan klein en vergroeit snel. Het laten staan van deze scheuten betekend



VOOR ALLE MERKEN AUTO'S
VERZORGEN WIJ UW:

- ✓ REPARATIE EN ONDERHOUD
 - ✓ REPARATIE VAN AUTOSCHADE
 - ✓ IN- EN VERKOOP
- TEVENS VERZORGEN WIJ UW
- ✓ APK KEURING
 - ✓ APK EN DIESELTEST

Biddinghuizen

Industrieterrein: Noorderbaan 8

tel.: 0321-332484, b.g.g. 332290

Maandag t/m Vrijdag 08:00 tot 17:15 uur

Zaterdag 10:00 uur tot 15:00 uur

Email : info@autofaber.nl

www.autofaber.nl



lichtbelemmering. Het trekken kan het beste gebeuren bij droog weer, de kans is dan klein dat de wonden als invalspoort dienen voor zwammen en ziekten. Het bespaart u later veel snoeiwerk.

Waterloten groeien tussen juli en augustus niet meer aan en de boom kan zodoende zijn energie dan verdelen over de bloemknoppen.

Zijscheutjes die naar binnen zijn gericht, of die niet nodig zijn als tak, kunnen na drie of vier bladeren worden ingekort zodat ze zich als vruchttakje (spore) ontwikkelen.

Rond de snoeiwonden van dickere takken, die weggenomen zijn tijdens de wintersnoei, ontwikkelt zich vaak een krans jonge scheutjes; hiervan kun je één goed geplaatst scheutje laten staan, de rest wordt weggenomen. Eind juli, tot half augustus, worden, wanneer er voldoende groei is, de verlengissen van de takken ingekort. Meestal wordt ongeveer 1/3e van de nieuwe groei weggenomen, maar dat kan naar behoefte wat korter of langer. Door dit toppen krijg je steviger takken, en een betere knopontwikkeling.

Wil je meer over fruitbomen weten kijk dan eens op

<http://www.fruitpluktuin.nl>

O ja, als je dickere takken wilt weghalen, eerst aan de onderkant inzagen om afschuren te voorkomen.

Spelt

Naast quinoa (zie clubblad 2 van 2014) is ook spelt een hype, vroeger sprak men van een rage; het is niet aan te slepen,

met alle gevolgen voor de prijsvorming. Maar wat is spelt eigenlijk? Spelt is een eenjarige plant uit de grassenfamilie, uit het geslacht tarwe en wordt beschouwd als een primitieve tarwesoort. Het is een graansoort die al vóór 7000 voor Chr. verbouwd werd. Spelt zou zijn ontstaan door natuurlijke kruisingen van emmertarwe en eenkoorn ca. 9000 jaar geleden. Circa 5000 jaar voor Chr. verscheen spelt in de Nijldelta en omstreeks dezelfde tijd werd vanuit Azië via de Balkan de akkerbouw naar Midden-Europa gebracht en vestigde zich ook in wat nu Zuid-Limburg is. Tot in de middeleeuwen was spelt een wijd verbreide graansoort, die ook op arme gronden en in een ruw klimaat wilde groeien. Na de middeleeuwen werd spelt verdrongen door gewone tarwe vanwege de hogere opbrengst en het feit dat het niet gepeld hoeft te worden. Bij het dorsen laat spelt het kaf van de korrel niet los. Nog een nadeel is de brosse aarspil (zeg maar de steel waaraan de korrel zit) waardoor gemakkelijk oogstverliezen kunnen optre-

Lijst van nieuwe leden

We heten alle nieuwe leden hartelijk welkom. Zoals al eerder opgemerkt is, schroom niet om advies te vragen of hulp een andere tuinders
Dhr. Kees Joor
Dhr. Jo Wolters
Dhr. Albert-Jan Kamp

den. Bij de biologische landbouw is er belangstelling voor de teelt van spelt, omdat het weinig bemesting nodig heeft en een goede resistentie tegen ziektes heeft. De korrel heeft



een hoog gehalte aan gluten, wat gunstig is voor het bakken van brood. Nadeel is dat het niet geschikt is voor mensen met een gluten-intolerantie en tarweallergie. Spelt wordt o.a. verbouwd in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België en ook in Nederland wordt op

BLONK

**GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN
KUNSTMEST - OPENBARE
WEEGBRUG**

**VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801
NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN
TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234**

kleine schaal spelt verbouwd. De zaaitijd is oktober, per ha is 200 kg ongepelde spelt nodig. Het gewas wordt ca. 1.30 m hoog en is legergevoelig (omvallen). Het gewas wordt geoogst begin augustus en de opbrengst ligt tussen de 4 en de 7 ton per ha. Na het pellen blijft 60 tot 70% over dus netto ca 2,4 tot 4,9 ton/ha. (gewone tarwe 6,5-10 ton/ha) Speltmeel, spelt-bloem en speltbrood zijn te verkrijgen bij de natuurvoedingswinkels en ook wel bij korenmolens en Welkoop. Steeds meer bakkers bieden minimaal één soort speltbrood aan. Momenteel wordt spelt veel gekruist met tarwe voor opbrengstverhoging en/of het verkrijgen van kortere aren. Gevolg is dat er meer



Plantweg 13
8256 SC Biddinghuizen
T 0321 – 769019
info@autobedrijfpesie.nl
www.autobedrijfpesie.nl

kruisingen met tarwe in de handel zijn dan de originele speltsoorten. Uiteraard tot ergernis en frustratie van de gebruikers die zweren bij het authentieke product. Tot slot waag ik me niet aan een oordeel wat het voordeel is van spelt t.o.v. tarwe voor onze voeding. Op internet kunt u kennis nemen van de verschillende standpunten. Jaap Geluk

Nu deze aflevering over fruitbomen gaat, even kijken of u deze spreekwoorden en gezegden kent. Zo niet dan horen we dat graag.
 *Appels met peren vergelijken.
 Die/wie appels vaart, die/wie appels eet.
 *Een appeltje voor de dorst.
 *Een schip met zure appels komt
 *Gouden appels op zilveren schalen zijn.
 *Een rotte appel in de mand, maakt de hele mand te schand.
 *Een appel die bedorven is schendt al wat in de korven is.

*Met de gebakken peren zitten.
 *Ik zal je een peer verkopen.
 *Een rijpe peer valt dikwijls in de drek.

Bestuur:

Voorzitter en tuinuitgifte
 Jan Booi
 tel.: 332126
 jansijbrand@gmail.com



Secretaris
 Ashok Somai
 tel.: 332174
 a.somai@upcmail.nl



Penningmeester
 Tijn Bouw
 tel.: 332010
 tijnbouw@kpnmail.nl

Arend Mulder
 tel.: 332381
 arendmulder@kpnmail.nl

Tuinkeuring
 Stoffel Aarsen
 Tel.: 331530
 chris.aarsen@kpnplanet.nl

	WWW.BIOLOGISCHPOOTGOED.NL Voor biologische poot aardappelen, plantuien, sjalotten en knoflook. Extra sterke rassen. Ook voor hobbytuinders.
CAREL BOUMA Alikruikweg 15 Biddinghuizen 0321-331384 06-51068038	Voor beschikbare rassen, teelt en plant informatie: zie website www.biologischpootgoed.nl

Volkstuinvereniging Biddinghuizen
<http://volkstuinbiddinghuizen.nl>
 Secretariaat: A. Somai, Uitloper 46, 8256 CD
 Kamer van Koophandel Lelystad nr.: 40059843

Contributie: € 6 per jaar
 Tuinuur: € 12,50 per are (100m2) per jaar
 Rekeningnr. vereniging NL78RABO 0348 1245 70
 t.n.v. M. Bouw